

[මෙය රැඳිව ඇත]

[අයිතිය රැඳිව ඇත]

Reserved]

[මෙය විභාග දෙපාර්තමේන්තුව / இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் / Department of Examinations, Sri Lanka]

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 1995 අගෝස්තු

கல்விப் பொதுத் தராதரப்பத்திர(உயர் தர)ப் பரீட்சை, 1995 ஓகஸ்த்

General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 1995

ශ්‍රේණි ගණිතය I

தூய கணிதம் I

PURE MATHEMATICS I

පැය තුනයි / மூன்று மணி / Three hours

01

S

I

ප්‍රශ්න හයකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

(i) $\frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5} + \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{1}{3 \cdot 5 \cdot 7} + \dots$

ශ්‍රේණියේ r වෙති පදය u_r ද

$$f(r) = \frac{-1}{4(r+2)(r+4)} \quad \text{ද නම්}$$

$$f(r) - f(r-2) = u_r \quad \text{බව පෙන්වන්න.}$$

එ නිසින් හෝ අන් අයුරකින් හෝ $\sum_{r=1}^n u_r$ සොයන්න.

$$\sum_{r=1}^{\infty} u_r = \frac{11}{96} \quad \text{බව අපෝහනය කරන්න.}$$

- (ii)
- n
- නම් ඕනෑම සෑහේ හොඳු නිඛිලයක් සඳහා
- $n^7 - n$
- යන්න 7 න් බෙදිය හැකි බව, ගණිත අනුක්‍රමය මූලධර්මය යොදාගනිමින් සාධනය කරන්න. සෑහේ නිඛිල සඳහා ප්‍රතිඵලය අපෝහනය කරන්න.
- $n^7 - n$
- සාධකවලට වෙන් කිරීමෙන්
- n
- නම් ඕනෑම නිඛිලයක් සඳහා එය 3 න් බෙදිය හැකි බව සාධනය කරන්න.

 n නම් ඕනෑම ඔත්තේ නිඛිලයක් සඳහා $n^7 - n$ යන්න 168 න් බෙදෙන බව අපෝහනය කරන්න.

(i) $7 - x \geq 2 \mid x^2 - 4 \mid$ තෘප්ත කරන්නා වූ x හි අගයන් සොයන්න.

(ii) ඕනෑම ධන x සඳහා

$$x + \frac{1}{x} \geq 2 \quad \text{බව පෙන්වන්න.}$$

 a, b හා c යනු ධන සංඛ්‍යා වේ.

ඉහත ප්‍රතිඵලය උපයෝගී කර ගනිමින්

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9 \quad \text{බව පෙන්වන්න.}$$

$$a + b + c = 1 \quad \text{නම්} \quad 2 - a, 2 - b \quad \text{හා} \quad 2 - c \quad \text{ධන බව පෙන්වා}$$

$$\frac{a}{2-a} + \frac{b}{2-b} + \frac{c}{2-c} \geq \frac{3}{5} \quad \text{බව අපෝහනය කරන්න.}$$

[අනෙක් පිට බලන්න.

3. (i) $2x^2 + 4xy + y^2 - 12x - 8y + 15 = 0$ නම් $1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$ හා $1 + \frac{1}{\sqrt{2}}$ අතර x පද්ධතිය නොහැකි බව ද 1 හා 3 අතර y පද්ධතිය නොහැකි බව ද පෙන්වන්න; මෙහි x හා y තාත්ත්වික වේ.

(ii) $(a + b)$ යනු $x^3 - 3abx - (a^3 + b^3) = 0$ සමීකරණයේ මූලයක් බව සත්‍යාපනය කරන්න.

a හා b ($a \neq b$) තාත්ත්වික නම් ඉහත සමීකරණයට තාත්ත්වික මූල එකක් පමණක් ඇති බව සාධනය කරන්න.

$x^3 - 6x - 6 = 0$ සමීකරණය ඉහත ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කර, එයට ඇත්තේ තාත්ත්වික මූල එකක් පමණක් යැයි දී ඇත් නම්, එම මූලය සොයන්න.

4. ධන නිඛිලය දර්ශකයක් සඳහා, ද මූලාවර් ප්‍රමේයය ප්‍රකාශ කර සාධනය කරන්න.

k නිඛිලයක් වුව, $p = \cos(6k + 1)\frac{\pi}{9} + i \sin(6k + 1)\frac{\pi}{9}$ නම්,

(a) $p^3 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

සහ (b) $\bar{p}^3 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

බව පෙන්වන්න: $\bar{p}$ යනු p හි සංකීර්ණ ප්‍රතිබිම්බය යි.

$z^6 - 8z^3 + 64 = 0$ සමුදායයේ z^3 හි අගය දෙක සොයා, ඒ නයින් එම සමීකරණයේ ප්‍රතිනිත මූල හය නිර්ණය කරන්න.

ඒ නයින් හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ, $x^2 - ax \cos \phi + b$ ආකාරයේ වූ තාත්ත්වික වර්ගය සාධක තුනක ගුණිතය ලෙස $x^6 - 8x^3 + 64$ ප්‍රකාශ කරන්න; මෙහි a, b, ϕ නිර්ණය කළ යුතු නියත වේ.

5. z_1 සහ z_2 යනු දී ඇති සංකීර්ණ සංඛ්‍යා දෙකකි. $z_2 - z_1$ සහ $\frac{z_2}{z_1}$ ආගන්තික ස්වභාවයේ නිරූපණය කරන ආකාරය පෙන්වන්න.

$z_0 = \cos \frac{\pi}{7} + i \sin \frac{\pi}{7}$ ද z_0, z_0^2, z_0^3 සංඛ්‍යා පිළිවෙලින් P, Q, R ලක්ෂ්‍යවලින් නිරූපණය වන්නේ ද නම් PQR ත්‍රිකෝණය සමද්විපාද බව පෙන්වා එහි කෝණ සොයන්න.

$z_1 = \omega z_0, z_2 = \omega z_0^3$ සහ $z_3 = \omega z_0^9$; මෙහි $\omega = \cos \frac{3\pi}{14} + i \sin \frac{3\pi}{14}$.

විස් $\left(\frac{z_2 - z_1}{z_2 - z_3} \right) = \frac{3\pi}{7}$

බව අපෝහනය කරන්න.

- (i) වරකඩ අක්ෂර සියල්ල ම යනිමින් KANAKARATANKULAM යන වචනයේ අක්ෂර දහසයෙන්ම සෑදිය හැකි විවිධ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව සොයන්න. (දත්තය සුදුසු කිරීම අනවශ්‍යයි.)

ඉහත වචනයෙන් (A, I) සම්බන්ධ අක්ෂර වරකඩ අක්ෂර හතර බැගින් යෙදවූ සෑදිය හැකි සංයෝජන ගණන 41 ක් බව පෙන්වන්න.

- (ii) ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙකු එක පුස්තකාලයක පරිදි, පිරිමි ළමුන් හය දෙනෙකු සහ ගැහැණු ළමුන් හතර දෙනෙකු, කි ආකාරයකින් වෘත්තාකාරව පිළිවෙල කළ හැකි ද?

7. n වන නිවැරදි වීම, $(1+x)^n$ සඳහා ද්විතීයික ප්‍රසාරණය ප්‍රකාශ කර සාධනය කරන්න.

ඉහත ප්‍රසාරණය යොදා, එළඹ ප්‍රමාණය

$${}^nC_0 + 2. {}^nC_1x + 3. {}^nC_2x^2 + \dots + (n+1). {}^nC_nx^n$$

යන්න, $[1 + (n+1)x] (1+x)^{n-1}$ ට සමාන බව පෙන්වන්න: මෙහි nC_r ට එහි සුදුසු අර්ථය ඇත.

(i) $[1 + (n+1)x] (1+x)^{2n-1}$ ප්‍රසාරණය කිරීමෙන් හා x^2 හි සංගුණකය සැලකීමෙන්,

$$({}^nC_0)^2 + 2. ({}^nC_1)^2 + 3. ({}^nC_2)^2 + \dots + (n+1). ({}^nC_n)^2$$

ප්‍රතිඵලයේ පෙළපාල, $\frac{(n+2)(2n-1)!}{n!(n-1)!}$ ට සමාන බව පෙන්වන්න; n යනු ධන නිවැරදිකි.

(ii) n ඉරට්ටේ නම්,

$${}^nC_0 + 3. {}^nC_2 + 5. {}^nC_4 + \dots + (n+1). {}^nC_n$$

ප්‍රතිඵලයේ පෙළපාල සොයන්න.

8. (i) චක්‍රාස්‍රිතයෙහි අර්ධ දක්වීමෙන් පටන් ගෙන,

$$y = -\csc x - x$$

ශ්‍රිතයේ චක්‍රාස්‍රිතය සොයන්න.

(ii) y යනු x හි ශ්‍රිතයක් වන අතර, ඒවා

$$x \frac{dy}{dx} = 3(y^2x^6 - y + 4)$$

යන්නෙන් සම්බන්ධ වී ඇත.

(a) $y = \frac{2}{x^3} \tan(2x^3 - \alpha)$ යන්න ඉහත සම්බන්ධය සපුරාලන බව, සෘජු ආදේශයෙන් පෙන්වන්න: මෙහි α නියතයකි.

(b) එම සම්බන්ධය

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2(4 + y^2)$$

යන්නට දෘතනය කළ හැකි බව පෙන්වන්න: මෙහි $v = x^3y$.

(iii) $x = 2t^3 + 1$ සහ $y = 4t^4 - 1$ නම්,

$$\left(\frac{dy}{dx}\right) \left(\frac{d^3y}{dx^3}\right) + 2 \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 = 0$$

බව පෙන්වන්න.

[අනෙක් පිට බලන්න

9. (i) $\int \frac{5x+3}{(x-1)(x+1)^2} dx$ සොයන්න.

(ii) $x+1 = \frac{1}{t}$ ආදේශයෙන්, $\int_1^3 \frac{dx}{(x+1)(4x-3-x^2)^{\frac{1}{2}}} = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{[(4t-1)(1-2t)]^{\frac{1}{2}}}$ බව පෙන්වන්න.

$t = \frac{1}{4} \cos^2 \theta + \frac{1}{2} \sin^2 \theta$ යෙදීමෙන්, හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ, අනුකලයේ අගය $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ බව පෙන්වන්න.

(iii) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta \cos^4 \theta d\theta = \frac{8}{315}$ බව පෙන්වන්න.

10. (a) ආසන්න අනුකලනය සඳහා සීමිත නීතිය ප්‍රකාශ කරන්න.

කොටස 5 ක් සලකමින්, $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ මගින් π ට ආසන්න අගයක් සෙවීමට සීමිත නීතිය උපයෝගී කර ගන්න.

(b) $f(x) = e^{\sin^{-1} x}$ නම්

$(1-x^2)f^{(2)}(x) - xf^{(1)}(x) = f(x)$ බව ද

$(1-x^2)f^{(3)}(x) - 3xf^{(2)}(x) = 2f^{(1)}(x)$ බව ද

පෙන්වන්න: මෙහි $f^{(n)}(x) = \frac{d^n}{dx^n} f(x)$.

ගණිත අභ්‍යුහන මූලධර්මය උපයෝගී කර ගනිමින් හෝ අන් අයුරකින් හෝ r නම් ඕනෑම ධන නිඛිලයක් සඳහා

$(1-x^2)f^{(r+2)}(x) - (2r+1)xf^{(r+1)}(x) = (1+r^2)f^{(r)}(x)$ බව සාධනය කරන්න.

$e^{\sin^{-1} x}$ හි මැක්ලොරින් ප්‍රසාරණය

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{2x^3}{3!} + \frac{5x^4}{4!} + \dots$$

බව පෙන්වන්න.

11. (i) $x = 2(1 + \sin \theta)$ හා $y = 2 \cos 2\theta$ පරාමිතික සමීකරණ මගින් C වක්‍රයක් දෙනු ලැබේ. $\theta \left(\neq \frac{n\pi}{2}; \text{ මෙහි } n \text{ යනු} \right.$

$\left. \text{මන්තේ නිඛිලයකි.} \right)$ පරාමිතිය සහිත ලක්ෂ්‍යයේ දී වක්‍රයට අදින ලද ස්පර්ශකයේ සමීකරණය ලබාගන්න.

වක්‍රයේ දළ කවු සටහනක් අඳින්න. $\theta = -\frac{\pi}{2}$ සහ $\theta = \frac{\pi}{2}$ දී ස්පර්ශක ගැන කුමක් කිව හැකි ද?

(ii) $x = 2+t$ හා $y = 2-t^2$ පරාමිතික සමීකරණ මගින් C වක්‍රයක් දෙනු ලැබේ; මෙහි $-\infty < t < \infty$ වේ. වක්‍රයේ දළ කවු සටහනක් අඳින්න.

ඉහත (i) හි සහ (ii) හි ඇති C, C' වක්‍ර එක එකෙහි සමීකරණවල කාටීසියානු ආකාර එකම බව පෙන්වන්න. වක්‍ර දෙක වෙනස් මන් දයි පැහැදිලි කරන්න.

12. පිළිවෙළින් $y^2 = x$ හා $y = 2 - x^2$ සමීකරණ මගින් දෙනු ලබන C_1 හා C_2 වක්‍රයන්හි කවු සටහන් එකම රූපයක අඳින්න.

C_1 හා C_2 වක්‍ර දෙක හා $y = 2$ සරල රේඛාව මගින් සහරයන්න S පෙදෙසෙහි වර්ගඵලය සොයන්න.

S පෙදෙස $4x+1=0$ රේඛාව වටා සෘජුකෝණ ත්වරකින් භ්‍රමණය කළ විට, ජනනය වන පරිමාව සොයන්න.