

03. ආගන්ති සටහනක $|z+1-2i|=1$ ලකුණු කරන්න. $|z|$ අවම වන පරිදි අනුරූප සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව $z = -k + 2ki$ ආකාරයෙන් දෙන බව පෙන්වන්න. මෙහි $k = \frac{5-\sqrt{5}}{5}$ වේ. තවද $\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{2} + \alpha$ බව පෙන්වන්න. මෙහි $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ වේ.

04. $(1+x^3)\left(\sqrt{x}+\frac{1}{x}\right)^6$ ප්‍රසාරණයේ නියත පදය සොයන්න.

4 පිටුව බලන්න

zero..

05. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2-x^2} - \sqrt{2}}{\sqrt{1-\cos x}}$ අගයන්න.

06. $y = \ln|2x|$, $x=1$, $x=2$ හා $y=0$ වක්‍රවලින් වටවූ පෙදෙසෙහි වර්ගඵලය $3\ln 2 - 1$ බව පෙන්වන්න. මෙම පෙදෙස x -අක්ෂය වටා රේඩියන් 2π කෝණයකින් භ්‍රමණය කළ විට ජනනය වන ඝන වස්තුවේ පරිමාව සොයන්න.

zero..

09. $S_1: x^2 + y^2 + 2x - 4y - 1 = 0$ වෘත්තයක් වන අතර $S_2: 3x + 4y + 1 = 0$ යනු සරල රේඛාවකි. $S_1 = 0$ හා $S_2 = 0$ හි ඡේදන ලක්ෂ්‍ය හරහා යමින් මූල ලක්ෂ්‍යය හරහා යන්නා වූ $S = 0$ වෘත්තයේ සමීකරණය සොයන්න. තවද $(-1, 0)$ හිදී $S = 0$ වෘත්තයට අදිනු ලබන අභිලම්භයේ සමීකරණය සොයන්න.

10. $\sin^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{x^2+4}}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) = \frac{\pi}{2}$ විසඳන්න.

අ.පො.ස (උ.පෙළ) පෙරහුරු පරීක්ෂණය - 2025

සංයුක්ත ගණිතය I

10 S I

13 ශ්‍රේණිය

- ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

B කොටස

11. (a) $0 < \lambda < 1$ සඳහා $f(x) = \lambda x^2 + 2x + 1$ ලෙස ගනිමු. $f(x) = 0$ හි මූල තාත්ත්වික ප්‍රතිඵල වශයෙන් $f(x) = 0$ හි මූල α හා β නම් මූලවල ඵලය හා ගුණිතය ලියා දක්වන්න.

මූල $\alpha + \frac{1}{\beta}$ හා $\beta + \frac{1}{\alpha}$ වන සමීකරණය $g(x) = 0$ මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.

මෙහි $g(x) = \lambda x^2 + 2(1+\lambda)x + (1+\lambda)^2$ වේ. $\lambda = \frac{1}{2}$ ආනුරූප $g(x) = 0$ සමීකරණය $H(x) = 0$ වේ

යැයි ගනිමු. $H(x)$ හි අවම අගය ද ඊට අනුරූප x හි අගය ද සොයා $y = H(x)$ ප්‍රස්තාරය අඳින්න.

- (b) $f(x) = \lambda x^3 - x^2 - 5x + \mu$ ලෙස ගනිමු. මෙහි $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ වේ. $f(x)$ ශ්‍රිතය $(x+1)$ හා $(x+2)$ යන්නෙන් බෙදූ විට ශේෂයන් පිළිවෙලින් 0 හා -12 වේ. λ හා μ සොයන්න. λ හා μ හි මෙම අගයන් යොදා ගනිමින් $f(x)$ යන්න ඊර්ධ්‍ය සාධක තුනක ගුණිතයක් ලෙස දක්වන්න.

12. (a) A, B හා C යනු කණ්ඩායම් තුනකි. එක් එක් කණ්ඩායමේ පිරිමි ළමයින් තිදෙනෙකු බැගින් ද ගැහැනු ළමයින් දෙදෙනෙකු බැගින් ද සිටිති. එක්තරා වැඩිමුළුවක් සඳහා සාමාජිකයින් 8 දෙනෙකු තෝරා ගත යුතුව ඇත.

(i) මෙම සිසුන්ගෙන් සාමාජිකයින් 8 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම් තෝරා ගත හැකි වෙනස් ආකාර ගණන සොයන්න.

(ii) වැඩිම වශයෙන් ගැහැනු ළමයින් තිදෙනෙකු අඩංගු වන පරිදි තෝරා ගත හැකි කණ්ඩායම් ගණන සොයන්න.

(iii) B කණ්ඩායමෙන් ගැහැනු ළමයෙකු හා පිරිමි ළමයෙකු පමණක් තෝරා ගැනීම අනිවාර්ය වන අතර තෝරා ගනු ලබන කණ්ඩායමේ ගැහැනු ළමයින් ගණන හා පිරිමි ළමයින් ගණන සමාන විය යුතුය. එවැනි කණ්ඩායම් කීයක් තෝරා ගත හැකි ද?

(b). $r \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා $U_r = \frac{1}{(r+1)(r+3)(r+5)}$ හා $f(r) = \frac{1}{(r+1)(r+3)}$ යැයි ගනිමු. $r \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා $f(r) - f(r+2) = 4U_r$ බව පෙන්වන්න.

ඒ නයින් $r \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා $\sum_{r=1}^n U_r = \frac{23}{480} - \frac{1}{4(n+2)(n+4)} - \frac{1}{4(n+3)(n+5)}$ බව පෙන්වන්න.

තවද, $\sum_{r=1}^{\infty} U_r$ අපරිමිත ශ්‍රේණිය අභිසාරී බව පෙන්වා එහි ඵලභාසය සොයන්න.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n (kU_r + (k+1)U_{n+1-r}) = \frac{23}{120}$ වන පරිදි k තාත්ත්වික නියතයේ අගය සොයන්න.

13. (a) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ හා $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ලෙස ගනිමු. A^{-1} හා B^{-1} ලියා දක්වන්න.

$P = A^2 B^{-1} - 5BA^{-1}$ වන පරිදි P න්‍යාසය සොයන්න.

$BPQA = C$ යැයි ගනිමු. මෙහි $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ වේ. Q න්‍යාසය සොයන්න.

(b) (i) $z_1 = 1+i$ හා $z_2 = \sqrt{3}+i$ වේ. z_1 හා z_2 සංකීර්ණ සංඛ්‍යා $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ නයින් $|z_1|$, $|z_2|$, $\text{Arg}(z_1)$ හා $\text{Arg}(z_2)$ අපේක්ෂනය කරන්න.

(ii) $|z_1 z_2|$ හා $\text{Arg}(z_1 z_2)$ සොයන්න.

(iii) නිර්මාණයේ පියවර පැහැදිලිව දක්වමින් $z_1 z_2$ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව ආගන්තික සටහනක ලකුණු කරන්න. ඒ නයින් ඉහත (ii) කොටසේ ලබා ගත් $|z_1 z_2|$ හා $\text{Arg}(z_1 z_2)$ ප්‍රතිඵල තහවුරු කරන්න.

(c) $z = \cos \theta + i \sin \theta$ ලෙස ගනිමු. n ධන නිඛිලමය දර්ශකයක් සඳහා ද මූලාවර් ප්‍රමේයය ප්‍රකාශ කරන්න. ද මූලාවර් ප්‍රමේයය භාවිතයෙන් $m, n \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා

$(\cos m\theta + i \sin m\theta)(\cos n\theta + i \sin n\theta) = \cos(m+n)\theta + i \sin(m+n)\theta$ බව පෙන්වන්න.


ඒ නයින් $\frac{\cos 5\theta + i \sin 5\theta}{\cos 7\theta - i \sin 7\theta} = \cos 12\theta + i \sin 12\theta$ බව අපේක්ෂනය කරන්න.

zero..

14. (a) $x \neq -1, -2$ හැර $f(x) = \frac{3x+7}{(x+1)(x+2)}$ ගැබ් ගනිමු. $x \neq -1, -2$ හැර $f(x)$ හි පළමු ව්‍යුත්පන්නය $f'(x)$ ගත්හ $f''(x) = \frac{(x+3)(3x+5)}{(x+1)^2(x+2)^2}$ මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.

සිරස් ස්වර්ණෝත්ප්‍රථ හා හැරුම් ලක්ෂය පැහැදිලිව දක්වමින් $y = f(x)$ ප්‍රස්ථාරයේ දළ භට්ටනයක් අඳින්න.

- (b) රූපයේ දැක්වෙන්නේ අරය x වූ අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසක් හා සෘජුකෝණාස්‍ර කොටසකින් සමන්විත ගෙවත්තකි. සෘජුකෝණාස්‍රයේ දිග, අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසේ අරය මෙන් සිව්ගුණයක් වේ. ගෙවත්තේ පරිමිතිය k නියත අගයක් ගනී. එහි වර්ගඵලය $A = \frac{\pi}{2}[4k - 3(\pi + 8)x]$ බව පෙන්වන්න. ගෙවත්තේ වර්ගඵලය උපරිම වීම සඳහා අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසේ අරය සොයන්න.



15. (a) $11(x^2 + x + 4) = A(2x^2 - x + 1) + (x + 2)(Bx + C)$ වන පරිදි A, B හා C තාත්ත්වික නියත සොයන්න.

එනමින් $\int \frac{(x^2 + x + 4)}{(x + 2)(2x^2 - x + 1)} dx$ අනුකලනය කරන්න.

- (b) කොටස් වශයෙන් අනුකලනය භාවිතයෙන් $I = \int e^{at} \sin bt \, dt$ නම් $I = \frac{e^{at}}{a^2 + b^2} [a \sin bt - b \cos bt] + C$

බව පෙන්වන්න. මෙහි C යනු අභිමත නියතය වේ.

- (c) $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^n \sin x \, dx$ ලෙස ගනිමු. $I_n = n \left(\frac{\pi}{2} \right)^{n-1} - n(n-1)I_{n-2}$ බව පෙන්වන්න.

එ නමින් $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^4 \sin x \, dx$ සොයන්න.

16. A හා B ලක්ෂ්‍යවල ඛණ්ඩාංක පිළිවෙළින් $(1, -2)$ හා $(2, 1)$ ලෙස ගනිමු. A හා B අඩංගු තලය මත P ලක්ෂ්‍යය විචලනය වන්නේ $AP : AB = 1 : 2$ වන පරිදි නම් P ලක්ෂ්‍යයේ සඵය වෘත්තයක් බව පෙන්වන්න. වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය හා අරය සොයන්න.

$S_1 \equiv x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0$ හා $S_2 \equiv x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + c_2 = 0$ ලෙස ගනිමු. $S_1 = 0$ හා $S_2 = 0$ වෘත්ත බාහිරව හා අභ්‍යන්තරව ස්පර්ශ වීම සඳහා තිබිය යුතු අවශ්‍යතාව ලියා දක්වන්න.

$S_1 \equiv x^2 + y^2 + 4x = 0$ හා $S_2 \equiv x^2 + y^2 + 2y + k = 0$ වෘත්ත දෙක සලකමු. මෙම වෘත්ත දෙක එකිනෙක ස්පර්ශ වේ නම් k සඳහා තිබිය හැකි අගයයන් සොයන්න.

දිල ලක්ෂ්‍යය හරහා යන්නාවූ ද $S_2 = 0$ වෘත්තය ප්‍රලම්භව ඡේදනය කරන්නාවූ ද $S = 0$ හා $S_2 = 0$ හි පොදු ජ්‍යාය $(1, 3)$ ලක්ෂ්‍යය හරහා යන $S = 0$ වෘත්තය නිර්ණය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් සමීකරණ ලබා ගන්න.

17. (a) $\sin \alpha + \sin \beta = p$ හා $\cos \alpha + \cos \beta = q$ වේ. $\frac{p}{q} = \tan\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$ බව පෙන්වා $\cos(\alpha + \beta) = \frac{q^2 - p^2}{q^2 + p^2}$

බව සාධනය කරන්න. ඒ නයින් $\sin(\alpha + \beta) = \frac{2pq}{p^2 + q^2}$ බව අපෝහනය කරන්න. තවද

$\cos(\alpha - \beta) = \frac{p^2 + q^2 - 2}{2}$ බව අපෝහනය කරන්න.

- (b) ABC ත්‍රිකෝණයක BC පාදය මත E හා D ලක්ෂ්‍ය පිහිටා අත්තේ $B\hat{A}E = E\hat{A}D = \frac{A}{4}$ හා $D\hat{A}C = \frac{A}{2}$ වන පරිදිය. තවද D යනු BC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය ද වේ. සුදුසු ත්‍රිකෝණ දෙකකට සයින් නීතිය යෙදීමෙන් $A\hat{B}C = A\hat{C}B$ බව පෙන්වන්න. තවද DB රේඛාව $DE : EB = 1 : k$ අනුපාතයට බෙදයි නම් ABE හා ACE ත්‍රිකෝණවලට සයින් නීතිය යෙදීමෙන් $\cos\left(\frac{A}{4}\right) = \sqrt{\frac{k+1}{2k}}$ බව පෙන්වන්න.

$k = 2$ නම් $A = 120^\circ$ වන බව අපෝහනය කරන්න.

- (c) $0 \leq \theta \leq 2\pi$ පරාසය තුළ $\cos 2\theta \tan \theta + \sin \theta = 0$ සමීකරණයේ θ සඳහා සියලු ම විසඳුම් සොයන්න.

zero..