

Combined Maths Short NotePure Maths.01-ആദ്യ ഭാഗം -

പെട്ടെന്ന് എഴുതേണ്ടതാണ്,

$$\text{അനുമാനം} = \text{അനുമാനം} \times \text{മുഴുവൻ} + \text{ശേഷം}$$

പ്രഥമ

* $F(x)$ എന്ന x ന്റെ ആദ്യ ഭാഗം $(x-a)$ ന്റെ ശേഷം $F(a)$ ആണ്.

$$(x-a) \overline{\begin{array}{r} g(x) \\ F(x) \\ \hline R \end{array}}$$

$$F(x) = (x-a)g(x) + R$$

$$x=a \text{ ആയാൽ}$$

$$F(a) = R$$

രണ്ടാം

* $F(x)$ എന്ന x ന്റെ ആദ്യ ഭാഗം $(x-a)$ ന്റെ ശേഷം $F(a)$ ആണ്.

$$(x-a) \overline{\begin{array}{r} g(x) \\ F(x) \\ \hline R \end{array}}$$

$$F(x) = (x-a)g(x) + R$$

$$x=a \text{ എടുത്താൽ}$$

$$F(a) = R$$

ശേഷം $F(a)$ ആണ്.

$$F(x) = (x-a)g(x)$$

$(x-a)$ എന്ന $F(x)$ ന്റെ ഘാതമാണ്.

* අධික ඉලක්කය වැඩි වන විට සමය ලකුණක් වුව
නිකරයකි.

(1) $F(x) = (x-a)(x-b)(x-c)h(x) + Ax^2 + Bx + C \leftarrow$ නාමය
[සමස්ත සමාන වන්නේ නිසිවින් ලකුණ]

(2) $F(x) = (x-a)(x-b)(x-c)h(x) + A(x-a)(x-b) + B(x-b)(x-c) + C(x-a)(x-c) \leftarrow$ නාමය
[A, B, C නිසිවින් තෝරා ගැනීම]

(3) $F(x) = (x-a)(x-b)(x-c)h(x) + A(x-a)(x-b) + B(x-a)(x-c) + C(x-b)(x-c) \leftarrow$ නාමය
[සමස්ත ඉලක්කය නාමය සමස්ත වන්නේ නිසිවින් ගනිය]

විච්ඡේදන නිත්ය නාම ආකාර

(01) $\frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$

(02) $\frac{1}{(x-a)(x-b)^2} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \frac{C}{(x-b)^2}$

(03) $\frac{1}{(x-a)(x^2+b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{Bx+C}{x^2+b}$

(04) $\frac{x^2}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + k$

(05) $\frac{x^3}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + kx + D$

II-ആം ഓർട്ടർ ന്നു രേഖകളെ

മൂല ജന്മ ജന്മകാല ജന്മ ജന്മകാല ജന്മകാല.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$\left[x + \frac{b}{2a}\right]^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0$$

$$\left[x + \frac{b}{2a}\right]^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$$

$$\left[x + \frac{b}{2a}\right]^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \frac{\pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{--- ①}$$

$$\beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{--- ②}$$

* മൂല അർത്ഥ ന്നു ജന്മകാല ജന്മകാല $b^2 - 4ac$. ജന്മ α, β മൂല
2 ജന്മ ജന്മകാല ജന്മകാല ജന്മകാല മൂല 2 ജന്മ അർത്ഥ ജന്മകാല.
ജന്മകാല മൂല ജന്മകാല ജന്മകാല ജന്മകാല.

* മൂല 2 അർത്ഥ ജന്മകാല ജന്മകാല
 $b^2 - 4ac > 0$ ജന്മകാല.

* മൂല ജന്മ അർത്ഥ ജന്മകാല ജന്മകാല
 $b^2 - 4ac = 0$ ജന്മകാല.

* உரு எது அந்தக் கிரை பதத்தில்
 $b^2 - 4ac \geq 0$ கல் பதில்.

* 2024 2 24 2024 2 24

b² - 4ac < 0 නම් ඊට ප්‍රතිඵල

* α, β ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ α യും β യും $\alpha + \beta$ ന്റെ പങ്കാളികളാണ്.

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

മർഗ്ഗം കൂടി നൽകി ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു

$y = ax^2 + bx + c$. എന്നിരുന്നാലും ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കുക


- [illegible]


பொது சபை 2 அங்கத்தினர் மதிப்புரை.

৭১০ নম্বর ফরমেতে

ඇලම හි 25800 ක්ද ඇති.

മറയ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ





$$a < 0$$

$$b^2 - 4ac < 0$$

$$a < 0$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$a < 0$$

$$b^2 - 4ac > 0$$

වර්ග ජාතිකයන් තිබීම

* $a \sin x + b \cos x = c$ ආකාරයේ ජාතිකයන්

$$a^2 + b^2 \geq c^2 \text{ විය යුතුය.}$$

නොදු මූල සම්බන්ධ ගැටලු

* $ax^2 + bx + c = 0$ හා $px^2 + qx + r = 0$ යන ජාතිකයන් දෙකක මූල නොදුස් නම්,

$$\frac{a}{p} = \frac{b}{q} = \frac{c}{r}$$

* $ax^2 + bx + c = 0$ හා $px^2 + qx + r = 0$ යන ජාතික දෙකක මූලයන් නොදු වේ නම්, නොදු මූලය α සඳහා

$$ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow \text{①}$$

$$px^2 + qx + r = 0 \rightarrow \text{②}$$

$$\text{①} \times p - \text{②} \times a$$

$$p\alpha^2 + pc - aq\alpha - ar = 0$$

$$\alpha(p\alpha - aq) = ar - pc$$

$$\alpha = \frac{ar - pc}{p\alpha - aq}$$

$$p\alpha - aq$$

විචලිත චරිතය

$$x^2 + bx + c = 0 \quad \begin{matrix} \swarrow \\ \searrow \\ \alpha \\ \beta \end{matrix}$$

α හා β දෑ මගින් බෙදා හැරිය හැකි බව: b හා c ඇතුළත් වන්නේ $\frac{\alpha^4}{\beta^4} + 1$ හා $\frac{\beta^4}{\alpha^4} + 1$ දෑ මගින්,

$$\alpha + \beta = -b \quad \alpha\beta = c$$

$$\alpha^4 + \beta^4 = b^4 - 4b^2c + 2c^2 \quad \alpha\beta^4 = c^4$$

$$x^2 - (b^4 + 2c^2 - 4b^2c)x + c^4 = 0 \quad \text{--- ②}$$

$$x = \alpha^4 \quad \text{හෝ} \quad x = \beta^4$$

$$y = \frac{\alpha^4}{\beta^4} + 1$$

$$y = \frac{\beta^4}{\alpha^4} + 1$$

$$y = \frac{\alpha^4 + \beta^4}{\beta^4}$$

$$y = \frac{\beta^4 + \alpha^4}{\alpha^4}$$

$$y = \frac{b^4 + 2c^2 - 4b^2c}{x}$$

$$y = \frac{b^4 + 2c^2 - 4b^2c}{x}$$


$$x = \frac{b^4 + 2c^2 - 4b^2c}{y}$$

$$c^4 y^2 - (b^4 + 2c^2 - 4b^2c)y + (b^4 + 2c^2 - 4b^2c)^2 = 0$$

ද්විතීයික හා ඔක්තව්

$$e^x = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \dots$$


$$* y = e^x$$



ഉപന്യാസം ഉത്തരം.

$$y = \log_e x.$$

$$y = e^x.$$



ഉപന്യാസം ഉത്തരം.

$$(1) \log_a (MN) = \log_a M + \log_a N$$

$$(2) \log_a \left(\frac{M}{N} \right) = \log_a M - \log_a N$$

$$(3) \log_a M^k = k \log_a M$$

$$(4) \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$(5) \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

എല്ലാ വ്യക്തികളെയും $\times$ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും
 r വ്യക്തികളെ r വ്യക്തികളെ $= {}^nPr$
 ക്രമം

ഉദാഹരണം 4

എല്ലാ വ്യക്തികളെയും n വ്യക്തികളെയും r വ്യക്തികളെ r വ്യക്തികളെ $= {}^nC_r$

$${}^nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

04 - ശ്രേണി -

ഏകദേശ ശ്രേണി

$$U_n = a + (n-1)d$$

* ഉള്ള n ന്റെ ശ്രേണി S_n ന്റെ,

$$S_n = \frac{n}{2} \{ 2a + (n-1)d \}$$

$$S_n = \frac{n}{2} \{ a + d \} \quad \rightarrow \text{പ്രധാന ഉപയോഗം}$$

ഗുണകശ്രേണി

$$U_n = ar^{n-1}$$

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{(1-r)}$$

$|r| < 1$ ആകട്ടെ,

$|r| < 1$ ആകട്ടെ, ഗുണകശ്രേണിയിലെ ആകെ തുക:

සමාන ශ්‍රේණි භාවිතය

(01)

$$\sum_{r=1}^n r = \frac{n}{2}(n+1)$$

$$\sum_{r=1}^n r^2 = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$$

$$\sum_{r=1}^n r^3 = \left(\frac{n}{2}(n+1)\right)^2$$

* මේ ආකාරයට S_n ශායක වීම U_r හැටි r^3, r^2, r හැටි ලියා ගත හැකිවන බවත්, එමගින් අනුක්‍රමයේ එකතුව ලබා ගන්න.

(02) අනුක්‍රමයේ r වන භාගයේ U_r හි r හි ලිනියර වන S_n සෙවීම

සමාන සං. වලින්,

1) $U_r = r + 2$

$A = -1/2$

$f(r) = Ar^2 + Br$

$B = -3/2$

$f(r+1) = A(r+1)^2 + B(r+1)$

$f(r) - f(r+1) = U_r$ බව පෙන්වමු,

$U_r = f(r) - f(r+1)$

$r=1$

$U_1 = f(1) - f(2)$

$r=2$

$U_2 = f(2) - f(3)$

$=$

$r=n-1$

$U_{n-1} = f(n-1) - f(n)$

$r=n$

$U_n = f(n) - f(n+1)$

$\sum_{r=1}^n f(r) - f(n+1)$

1. തരികെ ക്രമത്തിൽ u_r രൂപ രേഖ S_n (മാറ്റമുള്ളതായി) കാണി

$$① \quad u_r = r^2 + 3r + 2.$$

$$u_r = (r+1)(r+2)$$

$$f(r) = \frac{(r+1)(r+2)(r+3)}{3 \times 1}$$

3x1 ← മാറ്റമുള്ളതായി കാണി
മാറ്റമുള്ളതായി

$$f(r-1) = \frac{(r)(r+1)(r+2)}{3 \times 1}$$

② u_r തരികെ ക്രമത്തിൽ S_n കാണി

$$① \quad u_r = \frac{1}{(r+1)(r+2)}$$

$$f(r) = \frac{1}{(r+1) \times 1}$$

മാറ്റമുള്ളതായി

$$f(r+1) = \frac{1}{(r+2) \times 1}$$

$$f(r) - f(r+1) = u_r.$$

$$② \quad u_r = \frac{1}{(3r-2)(3r+1)(3r+4)}$$

$$f(r) = \frac{1}{(r+1)(3r+4) \times 2 \times 3}$$

മാറ്റമുള്ളതായി

3x2 ← മാറ്റമുള്ളതായി
(r → 4 = 3)
മാറ്റമുള്ളതായി

u_r തരികെ ക്രമത്തിൽ S_n കാണി. തരികെ ക്രമത്തിൽ u_r രൂപ രേഖ S_n (മാറ്റമുള്ളതായി) കാണി. തരികെ ക്രമത്തിൽ u_r രൂപ രേഖ S_n (മാറ്റമുള്ളതായി) കാണി.

* தொகுதி மொத்த மொத்தம்

Eg? $\frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + \dots + \frac{1}{99.101}$ மொத்தம்.

$$U_r = \frac{1}{(2r-1)(2r+1)} \text{ வி.}$$

$$\frac{1}{(2r-1)(2r+1)} = \frac{A}{(2r-1)} + \frac{B}{(2r+1)}$$

$$U_r = \frac{1}{2(2r-1)} - \frac{1}{2(2r+1)} \quad \left. \begin{array}{l} \text{தொகுதி : } \frac{1}{2} \text{ மொத்தம்} \\ \text{வினா : } \frac{1}{2} \text{ மொத்தம்} \end{array} \right\}$$

105 - தொகுதி மொத்த மொத்தம் -

$$A_{m \times n} \rightarrow \begin{array}{l} m - \text{செத} \quad !!! \\ n - \text{தொகுதி} \quad \equiv \equiv \equiv \end{array}$$

(01) செத தொகுதி

$$R_{1 \times 3}, F_{1 \times 2}$$

(02) தொகுதி தொகுதி

$$C_{3 \times 1}, D_{2 \times 1}$$

(03) தொகுதி தொகுதி

* செத மொத்த தொகுதி தொகுதி தொகுதி தொகுதி.

$$A_{2 \times 2}, B_{3 \times 3}$$

(04) தொகுதி தொகுதி

$$O_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(05) චතුර්ත න්‍යාසය.

* උදාහරණ චතුර්තය මත ප්‍රකාශයක් ඇති කර ගැනීම

$$A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(06) අදිෂ්‍ය න්‍යාසය

* චතුර්ත න්‍යාසයක සහ චතුර්තයක සහ අදිෂ්‍යයක් මගින් ගුණ කළ හැක.

$$A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(07) චතුර්ත න්‍යාසය.

$$I_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

න්‍යාස චරිතයන්

* න්‍යාස නිතරම කිරීමේදී.

i) $A + B = B + A$

ii) $(A + B) + C = A + (B + C)$

iii) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$

* න්‍යාස 2 ක ගුණ කිරීමේදී

i) $AB \neq BA$

ii) $(AB)C = A(BC)$

$\lambda(AB) = A(\lambda B) = (\lambda A)B$

iii) $A(B + C) = AB + AC$

iv) $AB = 0$ නිසා, $A = 0$ හෝ $B = 0$ වීම අනිවාර්ය නොවේ.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ഉണ്ടായ ഗുണിത ഫലം

$$A_{2 \times 3} \times B_{3 \times 1} = AB_{2 \times 1}$$

$$A_{2 \times 1} \times B_{1 \times 2} = AB_{2 \times 2}$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$$

$$1 \rightarrow ae + bg$$

$$2 \rightarrow af + bh$$

$$3 \rightarrow ce + dg$$

$$4 \rightarrow cf + dh$$

ഗുണനയുടെ ഔദ്യോഗിക

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ e & f & g \end{bmatrix}$$

$$A^T = A' = \begin{bmatrix} a & e \\ b & f \\ c & g \end{bmatrix}$$

ലഭിക്കുന്ന ഗുണന

$$A = A^T$$

ഇതാണ് ലഭിക്കുന്ന ഗുണന

ഇതാണ് ഗുണന

$$A \text{ ഇതാണ് }$$

ഗുണനയെ

$$\longrightarrow AA^T = I$$

* അന്തിമ

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

അന്തിമ അന്തിമയെ, $|A|$

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \text{ නොමැතිවේ. (20)}$$

නිෂ්පාදන ප්‍රතිලෝමය

$AA^{-1} = A^{-1}A = I$ වන පරිදි පවතින A^{-1} නිෂ්පාදන ප්‍රතිලෝමය වේ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$AA^{-1} = I$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} a + 2c &= 1 \quad \text{--- (1)} & 3a - c &= 0 \\ b + 2d &= 0 & 3b - d &= 1 \quad \text{--- (2)} \end{aligned}$$

සමීකරණ 4 විසඳා a, b, c, d සොයා A^{-1} ලබා ගත හැකිය.

$$|A| = -1 - 6 = -7 \quad A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

නේ තුමය,

- i) ප්‍රධාන විකේතයේ ආවේ 2 වැනි කිරීම.
- ii) අනෙක් විකේතයේ ආවේ දෙවන $\rightarrow$ ලකුණක් වැනි කිරීම.

(06) අනුකලනය

$$(01) y \longrightarrow 0$$

$$(02) y = x \longrightarrow 1$$

$$(03) y = x^n \longrightarrow nx^{n-1}$$

$$(04) \sin x \longrightarrow \cos x$$

$$(05) \cos x \longrightarrow -\sin x$$

$$(06) \tan x \longrightarrow \sec^2 x$$

$$(07) \operatorname{cosec} x \longrightarrow -\cot x \cdot \operatorname{cosec} x.$$

$$(08) \sec x \longrightarrow \tan x \cdot \sec x.$$

$$(09) \cot x \longrightarrow -\operatorname{cosec}^2 x.$$

$$(10) e^x \longrightarrow e^x.$$

$$(11) \ln x \longrightarrow \frac{1}{x}.$$

$$(12) \sin^{-1} x \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(13) \cos^{-1} x \longrightarrow \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(14) \tan^{-1} x \longrightarrow \frac{1}{1+x^2}.$$

101) අවකලනය

↳ අවකලනය භාවිතයෙන්
විභේදන ශීර්ෂය.

$f'(x)$

0 වැනි වර

x

$\oplus$ $\ominus$

$\cap$

1 වැනි වර

x^2

$\oplus$ $\ominus$



$\cup$

1) අවකලනය නිර්වචනය $y = f(x)$
හි වෙනස් වූ අවස්ථාවන්හි ලබා ගන්න

$$y = f(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

2) නිකුත් කිරීම



නිරවද්ශ නිකුත් කිරීම

3) ගැලපුම් ලේඛන සෑදීමේදී x
වෙනස් වූ අවස්ථාවන්හි

$$f'(x) = 0$$

එවිට x අගයයන් වෙනස් වූ විට y අගයයන්
ලබා ගන්න.

$f'(x)$ හා $f''(x)$

4) ස්ථරය ස්ථරයෙන් සිටීම

↳ $f'(x) = 0$ වන x අගයයන්

$f'(x) \rightarrow$ භූමිකාව $\rightarrow$ ස්ථරය

$f''(x)$ හි සලකා බැලීම

5) නිරවද්ශ ස්ථරයෙන් සිටීම

↳ $f'(x) = 0$ වන x අගයයන්

$$x \rightarrow f(x)$$

ස්ථරය

නිරවද්ශ නිකුත් කිරීම


නිරවද්ශ නිකුත් කිරීම

6) ගැලපුම් වල ස්ථරයන් නිරූපණය
නිර්වචනය.

$f'(x)$

$f''(x)$

සලකා බැලීම



$f''(x) > 0$ වන විට

නිකුත් කිරීම

$f''(x) > 0 \rightarrow$ උඩට

$f''(x) < 0 \rightarrow$ පහට

$\oplus$

$\ominus$


නිරවද්ශ නිකුත් කිරීම



No. _____
Date: _____

රූප	ම.ම	ඵලය
	$2\pi r + 2\pi r h$	$\pi r^2 h$
	$\pi r \times \text{slant height}$ $\pi r \sqrt{h^2 + r^2}$	$\frac{1}{3} \pi r^2 h$
	$4\pi r^2$	$\frac{4}{3} \pi r^3$
	මුහුණත මට්ටම ඇතුළත $2\pi r^2 + 2\pi r^2$ මතු $2\pi r^2 + \pi r^2$ මතු මට්ටම	$\frac{2}{3} \pi r^3$

Main tute-05



$$m.v = xy$$

$$A = xy - 1$$

$$\text{දී ඇති, } 1536 = (y-12)(x-8)$$

$$y-12 = \frac{1536}{(x-8)}$$

$$y = \frac{1536 + 12(x-8)}{(x-8)}$$

උතුරු දිශාවේ උතුරු දිශාවේ උතුරු දිශාවේ $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ (10)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} \quad y = f(u) \quad \text{දී ඇති නිසා.}$$

ආවේණික නාමය.

* ආවේණික දිගු වල ආවේණිකය.

$x = f(t)$ හා $y = g(t)$ (x, y) ආකාරයෙන් x, y (10)

$$y = 2x + 3$$

$$x = t \quad y = 2t + 3$$

$$(x, y) = (t, 2t + 3)$$

$x^2 + y^2 = 4$ ආවේණිකය ආවේණිකය.

$$(x, y) = (2\cos\theta, 2\sin\theta)$$

04 ආවේණිකය.

ආවේණිකය, ආවේණිකය හා ගැටළු ආකාරය.

$$(1) \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$(2) \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$(3) \int (ax+b)^n = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} + C$$

$$(04) \int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + C$$

$$(05) \int \frac{f'(x) \cdot dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C$$

$$(06) \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$(07) \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$(08) \int \sec^2 x \cdot dx = \tan x + C$$

$$(09) \int \operatorname{cosec}^2 x dx = -\cot x + C$$

$$(10) \int \sec x \cdot \tan x \cdot dx = \sec x + C$$

$$(11) \int \operatorname{cosec} x \cdot \cot x \cdot dx = -\operatorname{cosec} x + C$$

$$(12) \int x^a \cdot dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$$

$$(13) \int e^x \cdot dx = e^x + C$$

$$(14) \int e^{ax+b} dx = \frac{e^{ax+b}}{a} + C$$

Sp:

$$(15) \int \cot x \cdot dx = \ln |\sin x| + C$$

$$(16) \int \sec x \cdot dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$(17) \int \operatorname{cosec} x \cdot dx = -\ln |\operatorname{cosec} x + \cot x| + C$$

$$(18) \int \frac{1}{1+x^2} dx = \tan^{-1} x + C$$

$$(19) \int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{ax^2+bx+c}$$

$$(i) b^2 - 4ac > 0$$

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)(x+\beta)} \rightarrow \text{partial fractions}$$

$$(ii) b^2 - 4ac = 0$$

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)^2} \rightarrow \frac{(x-\alpha)^{-2+1}}{-2+1}$$

$$(iii) b^2 - 4ac < 0$$

$$\int \frac{dx}{(x+\alpha)^2 + \beta} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{\beta}} \tan^{-1} \frac{x+\alpha}{\sqrt{\beta}} + C$$

$$\int \frac{px+q}{ax^2+bx+c} dx \quad \text{എങ്ങനെ}$$

(i) $b^2 - 4ac > 0 \rightarrow$ കിട്ടുന്നത

(ii) $b^2 - 4ac = 0 \rightarrow$ കിട്ടുന്നത

(iii) $b^2 - 4ac < 0 \rightarrow px+q = x(2ax+b) + M$
 $\text{ഉദാ: } x(2ax+b) + M$

$$\int \frac{f(x)}{g(x)} dx$$

$f(x)$ കെ തുടങ്ങി $g(x)$ കെ തുടങ്ങി
 * ഹരന്റെ അളവ് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന കഴിവ് ഉണ്ട്
 $\rightarrow$ കിട്ടുന്നത

* ഹരന്റെ അളവ് കൂടാൻ കഴിയാത്ത കഴിവ് ഉണ്ട്
 $\rightarrow$ ഉദാ: ഹരന്റെ അളവ് കൂടാൻ കഴിയാത്ത കഴിവ് ഉണ്ട്

$$(14) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C$$

$$(15) \int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(16) \int \frac{1}{\sqrt{b^2-(ax)^2}} dx = \frac{1}{a} \sin^{-1} \left(\frac{ax}{b} \right)$$

$$* \int f(x) \cdot f'(x) = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1}$$

$$\int \frac{\text{dividend}}{\text{divisor}} \cdot dx \quad \text{Dividend} = \gamma (\text{mod. divisor}) + M$$

$$(19) \int \frac{px+q}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = px+q = \gamma (2\gamma x+b) + M$$

$$(20) \int \frac{2\gamma x+b}{2\sqrt{ax^2+bx+c}} = \sqrt{ax^2+bx+c} + D$$

* අනුකූලනය සඳහා සම්මත ආකාර

$$(01) \int \frac{1}{ax^2+bx+c} dx.$$

* හරය වර්ගාකාරී කළොත් මුළු අනුකූලනය ලබා ගැනේ.

$$(02) \int \frac{px+q}{ax^2+bx+c} dx.$$

* වළලු හරයේ අනුකූලනය ලබා දීම සහයා දෙනු ලබන වර්ගාකාරී කළේ.

$$(03) \int \frac{k}{ax^3+bx^2+c} dx.$$

* හරය තුළ 2 වැනි සැල අවස්ථාවක් හරය භාවිත වලට ගත් කළ.

$$(04) \int \frac{k}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx.$$

* වර්ගාකාරී වළ අනුකූලනය වර්ගාකාරී මගින් ලබා ගැනේ.

$$(05) \int \sqrt{ax^2+bx+c} dx.$$

* වර්ගාකාරී මගින් ලබා ගත හැකි වලට අනුකූලනය කළේ.

Eg: i) $\int \sqrt{(x+p)^2 + q^2} \cdot dx \longrightarrow x+p = q \tan \theta$

ii) $\int \sqrt{(x+p)^2 - q^2} dx \longrightarrow x+p = q \sec \theta$

iii) $\int \sqrt{q^2 - (x+p)^2} dx \longrightarrow x+p = q \sin \theta$

അതിന്റെ ഉപയോഗം എഴുതുക

$$\int f(x) \cdot g(x) \cdot dx$$

ഉദാ: $\int f(x) \cdot g(x) \cdot dx = \int \left(\frac{g(x)}{f(x)} \right) \cdot \left(f(x) \cdot dx \right)$

$$\int \frac{1}{x^2} \cdot x \cdot dx$$

ഇത് ഒരു നിയമം എഴുതുക.

എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും ഉപയോഗിക്കുക.

Sp:

* $\int \frac{1}{\sqrt{Ax^2 + Bx + C}} dx$

$$Ax^2 + Bx + C$$

→ വിശ്ലേഷണം (Δ)

Δ = 0 → 2n ഘാതം

Δ < 0 → tan θ

Δ > 0 → sec θ

(sin⁻¹ ഘാതം)

വിശ്ലേഷണം: $\frac{f(x)}{\sqrt{f(x)}}$

$$(66) \int \cos ax \cdot \sin bx \cdot dx.$$

*CD ആയ ഓരോ.

$$(67) \int \cos^2 x \cdot \sin x \cdot dx.$$

പുറം തൊഴി ആണ് തുടർച്ചയായുള്ള മാർഗ്ഗം.

ഉദാ. $\sin x = t$

മുൻപ് നമുക്ക്

$$\cos x = \frac{dt}{dx}.$$

മുൻപ് നമുക്ക്

$$\left. \begin{aligned} * 1 - \cos x &= 2 \sin^2 x/2 \\ * 1 + \cos x &= 2 \cos^2 x/2 \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} * \sin^2 \theta &= \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \\ * \cos^2 \theta &= \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \end{aligned} \right\}$$

* തുടർച്ചയായുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിക്കുക.

$$\int \frac{A + B \sin \theta + C \cos \theta}{P + Q \sin \theta + R \cos \theta} d\theta$$

$$\left. \begin{aligned} \sin \theta &= \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos \theta &= \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{aligned} \right\}$$

$$(68) \int \tan^2 x \cdot dx$$

$\tan x + 1$ രൂപയിൽ നൽകി ഉപയോഗിക്കുക.

$$(69) \int \frac{px+q}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$$

* ഗുണകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക.

$$(70) \int \frac{1}{(x+k)\sqrt{ax^2+bx+c}} dx.$$

$$k + \frac{1}{t} \text{ ഉപയോഗിക്കുക}$$

ഒരു ചുരുക്ക മാർഗ്ഗം,

* සාධන අනුකූලතාව

$$\int_a^b f(x) \cdot dx, (f(x))_a^b = f(b) - f(a).$$

* සාධන අනුකූලතා නිමා ප්‍රවේශය

$$\int_0^a f(x) \cdot dx = \int_0^a f(a-x) \cdot dx.$$

$$I = \int_0^a f(a-x) \cdot dx.$$

$$a-x = t \quad x \rightarrow 0 \mid t \rightarrow a$$

එසේ

$$-dx = dt \quad x \rightarrow a \mid t \rightarrow 0$$

$$\therefore I = \int_a^0 f(t) \cdot (-dt)$$


$$I = - \int_a^0 f(t) \cdot (dt)$$

$$I = \int_0^a f(x) \cdot dx.$$


$$\int_0^a f(x) = \int_0^a f(a-x) \cdot dx \quad //$$

ഭൂമിശാസ്ത്ര രേഖാചിത്രം


(1) ഭൂമിശാസ്ത്ര രേഖാചിത്രം




(2) രേഖാചിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന രേഖാചിത്രം



(3) ഭൂമിശാസ്ത്ര രേഖാചിത്രം




(4) ഭൂമിശാസ്ത്ര രേഖാചിത്രം 2-ാം രേഖാചിത്രം



$y = mx + c$
 $ax + by + c = 0$


(05) ത്രികോണിന്റെ വിസ്താരം



$$\text{Area} = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

ഒരു ട്രൈഗണമെട്രിക് ഫോർമുല,

(06) രണ്ടു രേഖകളുടെ കോണിന്റെ താളം




$$\tan \theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right|$$

മുകളിലെ $\tan \theta (+)$

താഴെ $\tan \theta (-)$


(07) രണ്ടു രേഖകളുടെ കോണിന്റെ താളം കണ്ടെത്താൻ



$$L_1 + \lambda L_2 = 0$$

λ കണ്ടെത്തുക

(08) രണ്ടു രേഖകളുടെ കോണിന്റെ താളം കണ്ടെത്താൻ



$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = m$$

$$\frac{y - b}{m} = \frac{x - a}{1} = t \quad (\text{പാരാമീറ്റർ})$$


* ഏതൊരു ഘൃഗാത ഘൃണരഡെജ ലത ലാഗത ധൃന ട.

$$\frac{y-b}{m} = t$$

$$\frac{x-a}{1} = t$$

$$\{y_0 = mt + b \quad x_0 = t + a\}$$

* $ax + by + c = 0$ ലെ രേഖാമതം. ഘൃത രേഖാത ലതാടന്ത ഘൃനര.



$$m_1 m_2 = -1$$


$$\left[\frac{y-b}{-a/b} \right] \left[\frac{x-a}{1} \right] = -1$$

കുഴപ്പമുണ്ടാകാതെ,

$$\left[\frac{y-b}{b} \right] = \left[\frac{x-a}{a} \right] = t$$

$$\{y = b + bt \quad \text{അഥവാ} \quad x = a + at\}$$

രേഖാമതം ലതാത രേഖാത ലതാടന്ത.



$$m M = -1$$


$$\frac{-a}{b} M = -1$$

$$M = \frac{b}{a}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \text{രേഖാമതം ലതാത} &= \frac{y-y_0}{x-x_0} = m \end{aligned} \right\}$$

$$\frac{y-y_0}{x-x_0} = \frac{b}{a}$$

(10) രണ്ടു പരബോളിക രേഖകൾ തമ്മിലെ



$$\frac{|a_1x + b_1y + c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm \frac{|a_2x + b_2y + c_2|}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

ഈ രണ്ടു പരബോളിക രേഖകൾ തമ്മിലെ ദൂരം കണ്ടെത്താൻ ഏതൊരു രീതിയും ഉണ്ട്. 2 ന് 1 ന് തുല്യമായ ഈ രണ്ടു രേഖകൾ തമ്മിലെ ദൂരം


$$\frac{|a_1x + b_1y + c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{|a_2x + b_2y + c_2|}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

കുറിപ്പ് നോക്കൂ
1) $k > 0$ ന്റെ കാര്യം.

രണ്ടു പരബോളിക രേഖകൾ തമ്മിലെ ദൂരം കണ്ടെത്താൻ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കാം. $k > 0$ ന്റെ കാര്യം നോക്കൂ.

2) $k < 0$ ന്റെ കാര്യം. ഈ രേഖകൾ തമ്മിലെ ദൂരം കണ്ടെത്താൻ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കാം.


(11) രണ്ടു പരബോളിക രേഖകൾ തമ്മിലെ ദൂരം കണ്ടെത്താൻ



$$P = \left(\frac{kx_1 + ly_1}{k+1}, \frac{ky_1 + ly_1}{k+1} \right)$$

$k > 0$ ന്റെ കാര്യം
 $k < 0$ ന്റെ കാര്യം

$$(a_1x_1 + by_1 + c)(a_1x_2 + by_2 + c) > 0 \text{ නම්,}$$



$$d = \left| \frac{ax + by + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right|$$

109 චක්‍රය. කර්තව්‍යය චක්‍රය හි

(01) චක්‍රය $(-g, -f)$ හි උපරි රේඛා චක්‍රය.

$$\{x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0\}$$

චක්‍රය $(-g, -f)$
උපරි $= r$.


චක්‍රයේ කර්තව්‍යය චක්‍රය

$$g^2 + f^2 - c > 0$$

$$\{g^2 + f^2 > c\} \text{ තර්කය.}$$

උපරි චක්‍රය	චක්‍රය
x^2, y^2 හි <u>නොපෙන්වයි</u> .	x^2 හි y^2 <u>සමතුලිත</u> <u>සමාන</u> <u>පාත්</u> . x, y හි <u>නොපෙන්වයි</u> .


(02) චක්‍රය උපරි චක්‍රය චක්‍රය චක්‍රය




$P(x_1, y_1)$

$$\left(\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \right) \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) = -1$$


$$(x_1 \neq x_2, x_2)$$



$$d < r$$



$$d = r$$




$$d > r$$

Let $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ be the circle and
 $lx + my + n = 0$ be the line. Then the condition for tangency is

$$(lg + mf - n)^2 = (l^2 + m^2)(g^2 + f^2 - c)$$

(03) Find the length of the tangent from the point $P(x_0, y_0)$ to the circle.




$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$


Length of the tangent from P to the circle is

$$d = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + 2gx_0 + 2fy_0 + c}$$


അമൃതം ചുറ്റുമ്പോൾ അത് അമൃതം ആകും.




$O_1, O_2 \in |r_1 - r_2|$ ആണ്



$O_1, O_2 \in |r_1 - r_2|$ ആണ്




$|r_1 - r_2| < O_1, O_2 < r_1 + r_2$




$O_1, O_2 = r_1 + r_2$ ആണ്.

(104) രണ്ടു സമീകരണങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക




അതേ 2-ആം ലെവലിൽ എങ്കിൽ.



ഈ ലെവലിൽ

$$\left. \begin{array}{l} S_1 - S_2 = 0 \end{array} \right\}$$

ലെവൽ ഇതിന്റെ




രേഖാ രേഖാ

$$S_2: x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

ഇതിന്റെ ലെവൽ ഇതിന്റെ

$$xx_0 + yy_0 + g(x+x_0) + f(y+y_0) + c = 0$$

(05) $S=0$ වෘත්තය හා $L=0$ රේඛාව ඡේදනය කිරීමේදී
 $S + \lambda L = 0$ ඡේදනය




$$S + \lambda L = 0 \quad (\lambda \text{ වෙනස්වන විට})$$

* නිසා $S + \lambda L = 0$ ගේ වෘත්තය
 සහ රේඛාව උක්තය ගණන ගත්තු
 විටම ආසන්න වෘත්තයක්
 නිරූපණය කළේය. (01)


(06) $S_1=0$ හා $S_2=0$ වෘත්තය ඡේදනය කර

$$S_1 + \lambda S_2 = 0$$

(07) ඔහු ඡායා සම්පූර්ණය.



08) චාලකයක චලිතයේ තීරයන්




මධ්‍යය (h, k) හි අරය r වන චාලකයේ චලිත සමීකරණය

$$(h + r \cos \theta, k + r \sin \theta)$$

10) ත්‍රිකෝණමිතීන්

	0	30	45	60	90
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞

වලංගු කරන ලද චාලකයේ සහ අනෙකුත් චාලකයන් වැඩාත්මක ක්‍රමවේදයන් මගින් ලබා දෙන ලද සමීකරණ



$\sin \pi = 0$ $\cos \pi = -1$
 $\sin \frac{3\pi}{2} = -1$ $\cos \frac{3\pi}{2} = 0$

ත්‍රිකෝණමිතික සමීකරණ.

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$$

} ඡායාරූපයේ ඇතුළත්
සෑදීම වලට යොදා ගන්න.

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$= 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$= 2 \cos^2 \theta - 1$$

Sp.

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

ඡායාරූපයේ සෑදීම
වලට යොදා ගන්න.

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) - \cos(A+B)]$$

$$\sin C + \sin D = 2 \sin \left(\frac{C+D}{2} \right) \cos \left(\frac{C-D}{2} \right)$$

$$\sin C - \sin D = 2 \cos \left(\frac{C+D}{2} \right) \sin \left(\frac{C-D}{2} \right)$$

$$\cos C + \cos D = 2 \cos \left(\frac{C+D}{2} \right) \cos \left(\frac{C-D}{2} \right)$$

$$\cos C - \cos D = 2 \sin \left(\frac{C+D}{2} \right) \sin \left(\frac{D-C}{2} \right) *$$

A, B, C ର ଓ ଓହ୍ଲେ ଓ,

$$A+B+C=\pi$$

$$A+B=\pi-C$$

$$\sin(A+B) = \sin(\pi-C)$$

$$\sin(A+B) = \sin C$$

$$A+B+C=\pi$$

$$A+B=\pi-C$$

$$\frac{A+B}{2} = \frac{\pi-C}{2}$$

$$\sin\left(\frac{A+B}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi-C}{2}\right)$$


ଓଓଓଓ

$$\cos(A+B) = -\cos C$$

$$\tan(A+B) = -\tan C$$


$$\sin\left(\frac{A+B}{2}\right) = \frac{\cos C}{2}$$

ସିନ ଥିଉରମ



$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

କୋସ ଥିଉରମ




$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

0109 නියමිතව නිර්ණය කළ හැකි නිදහස් අනුපාතිකය.



$$\begin{aligned} a &= b \cos C + c \cos B \\ b &= a \cos C + c \cos A \\ c &= a \cos B + b \cos A \end{aligned}$$

ත්‍රිකෝණමිතික මූලධර්මයන් සාධනයේ භූමිකාව.

from Prasanna

$$y = a \cos(bx + c) + d$$

maheepalq

Short Note

$$-1 \leq \cos(bx + c) \leq +1 \text{ බැවින්}$$

$$c - a \leq y \leq a + c$$

$$\text{නම් කළ විට } -\pi \leq x \leq \pi$$

මාදු විකල්ප

(i) $\sin x = \sin \alpha$ නම්,
 $x = n\pi + (-1)^n \alpha$


(ii) $\cos x = \cos \alpha$ නම්
 $x = 2n\pi \pm \alpha \quad (n \in \mathbb{Z})$
 $(0 \leq x < 2\pi)$

$$\left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right) \quad (n \in \mathbb{Z})$$


:

(iii) $\tan x = \tan \alpha$ නම්,
 $x = n\pi + \alpha \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$
 $n \in \mathbb{Z}$


Sin graph



cos graph



tan graph



ജനറൽ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ

$y = \sin^{-1} x$

$-\pi/2 \leq \sin^{-1} x \leq \pi/2$

$y = \cos^{-1} x$

$0 \leq \cos^{-1} x \leq \pi$

$y = \tan^{-1} x$

$-\pi/2 < \tan^{-1} x < \pi/2$

II ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഓരോ

ബ്രാഞ്ചുകൾ പരസ്പരം പരസ്പരം വേർതിരിയുന്ന പ്രദേശങ്ങളായി തിരിക്കപ്പെടുന്നു.

$z = x + iy$

അതിൽ x യെ $Re(z)$ എന്ന്

$i\sqrt{-1}$ ഭാഗത്തെ y നെ $Im(z)$ എന്ന്

$x = Re(z)$

$y = Im(z)$

പ്രതികൂലമായ $\bar{z} = x - iy$ ന്റെ.


പ്രതികൂലമായ ബ്രാഞ്ചുകൾ പരസ്പരം

പരസ്പരം പരസ്പരം വേർതിരിയുന്ന പ്രദേശങ്ങളായി തിരിക്കപ്പെടുന്നു. **പ്രതികൂലമായ** ഭാഗം വേർതിരിയുന്നു.

പ്രതികൂലമായ

$Im(z)$


$z = x + yi$



$Re(z)$

$$\textcircled{1} \begin{cases} \sqrt{A} = i \\ z = x + yi \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} i^2 = -1 \\ i^3 = -i \\ i^4 = 1 \end{array} \right\}$$

$$02 \text{ Ex } 2/21$$



සාකච්ඡා සාදාගන්නා මාර්ගය හා ඵලය

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$


എന്താണ് ഹോമിയോ പാതയുടെ
 ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ്? ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ്
 ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ്.

சூதாச
விஷ்ணுவ
பிரபல

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ.

Arg (z)


* ϕ ന്റെ ഘനത 0 മുതൽ 2π വരെ
 ϕ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ $\cos \phi$
 ന്റെ മൂല്യം $\cos 0 = 1$ മുതൽ $\cos 2\pi = 1$
 വരെ മാറുന്നു. $\phi = 0$ മുതൽ $\phi = \pi$
 വരെ $\cos \phi$ ന്റെ മൂല്യം 1 മുതൽ -1
 വരെ മാറുന്നു. $\phi = \pi$ മുതൽ $\phi = 2\pi$
 വരെ $\cos \phi$ ന്റെ മൂല്യം -1 മുതൽ 1
 വരെ മാറുന്നു.



arg(z).

മുഖ്യത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂലങ്ങൾ ($120^\circ, -240^\circ, 360^\circ \dots$)

മൂലത ചിത്രീകരണം.




മൂലത ചിത്രീകരണം.

$$\left. \begin{aligned} z &= x + iy \\ z &= r \cos \theta + i \cdot r \sin \theta \end{aligned} \right\} \begin{aligned} z &= r [\cos \theta + i \sin \theta] \\ z &= |z| [\cos(\arg z) + i \sin(\arg z)] \end{aligned}$$

ഓരോ ലംബത്തിനും z കൂടി x ($\cos$ (മൂലത) $+ i \sin$ (മൂലത) θ)

Eg: 1) $z = 1 + \beta i$



മൂലത ചിത്രീകരണം.

മാനദൈർഘ്യം ഉള്ള ഗുണനം

ഈ ഗുണനം പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ്.

① $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$

മാനദൈർഘ്യം.

∴ $z \cdot \bar{z} = |z|^2 //$

$z = x + iy$ ന്റെ,

$\bar{z} = x - iy$

$z \cdot \bar{z} = (x + iy)(x - iy)$

$= (x^2 - (iy)^2)$

$= x^2 - (-1)y^2 = x^2 + y^2$

$$(ii) |z_1 z_2|^2 = (z_1 z_2)(\overline{z_1 z_2})$$

$$= z_1 z_2 \cdot \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$$

$$= (z_1 \cdot \overline{z_1})(z_2 \cdot \overline{z_2})$$

$$= |z_1|^2 \cdot |z_2|^2$$

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| \quad ||$$

$$(iii) \left| \frac{z_1}{z_2} \right|^2 = \left| \frac{z_1}{z_2} \right| \cdot \left| \frac{z_1}{z_2} \right|$$

$$(iv) |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$= \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$$

theory note board
for number system solution.

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|^2}{|z_2|^2}$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad ||$$

proof.

$$1) \overline{\overline{z}} = z$$

$$2) z \cdot \overline{z} = |z|^2$$

$$3) \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

$$4) z + \overline{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$$

$$5) \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$$

$$6) z - \overline{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$$

$$7) \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$$

$$8) \left(\frac{z_1}{z_2} \right)^2 = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$$

$$9) \overline{\overline{z}} = z$$

$$10) \overline{a} = a$$

$$a \in \mathbb{R}$$

മുഖ്യതയായ ചില ഉത്തരവുകൾ.

$$\textcircled{1} \arg(z_1) + \arg(z_2) = \arg(z_1 \cdot z_2)$$

$$\textcircled{2} \arg(z_1) - \arg(z_2) = \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$$

$$\textcircled{3} \arg(z^n) = n \cdot \arg(z)$$

ഉത്തരവ് ഉത്തരവ്.

$$* z = r [\cos \theta + i \sin \theta]$$


അതുകൊണ്ട്,

$$z^n = r^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)]$$

ഏകദേശം വരെയുള്ള ചില ഉത്തരവുകൾ.

$$\textcircled{1} \arg(z_1 - z_2) = \theta$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 വെക്ടർ ഏകദേശം



ഉത്തരവ് ഉത്തരവ്

$$\textcircled{1} |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\textcircled{2} \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\textcircled{3} |1| = 1$$

$$\textcircled{4} |i| = 1$$

$$(25) \overline{z_1 - z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

$$(26) \overline{z_1 - z_2} = (\overline{z_1} - \overline{z_2})$$

$$(27) \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$(28) \overline{\overline{z}} = z$$

$$(29) \overline{i} = -i$$

$$(30) \overline{\overline{a}} = a$$

$$(31) z + \overline{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$$

$$(32) z - \overline{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$$

$$(33) \operatorname{Re}(z_1 + z_2) = \operatorname{Re}(z_1) + \operatorname{Re}(z_2)$$

$$(34) \operatorname{Im}(z_1 + z_2) = \operatorname{Im}(z_1) + \operatorname{Im}(z_2)$$

$$(35) \operatorname{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \operatorname{Arg}(z_1) + \operatorname{Arg}(z_2)$$

$$(36) \operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \operatorname{Arg}(z_1) - \operatorname{Arg}(z_2)$$

$$(37) \operatorname{Arg}(\overline{z}) = -\operatorname{Arg}(z)$$

2017 ുറു വരവു കർമ്മം കൽക്കു മുറ്റുതു മന്നു
 ഞയ കുറുതു.


- * ഓരുകു ലംഗു-ഉറുതു ലംഗു
- * നയ-ലംഗു ഓരുകു വരുക
- * ഉറുതു-കർമ്മം വരുക
- * കർമ്മ-കർമ്മം.

(a) ഉറുതു ലംഗു.

$$z = r (\cos \theta + i \sin \theta) \text{ നെ}$$

$$z^n = r^n [\cos (n\theta) + i \sin (n\theta)]$$

(b) കർമ്മം ഉറുതു കർമ്മം



$$a \times b = |a| |b| \sin \theta$$

* കർമ്മം a, b കർമ്മം കർമ്മം

കർമ്മം കർമ്മം - കർമ്മം കർമ്മം.

- കർമ്മം കർമ്മം കർമ്മം കർമ്മം കർമ്മം കർമ്മം
- a കർമ്മം a കർമ്മം കർമ്മം കർമ്മം കർമ്മം കർമ്മം

കുറേ ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപതന്ത്രങ്ങൾ

- കുറേ ഉപയോഗപ്രദമായ തത്വങ്ങൾ ഉണ്ട്.

- $a \cdot b = b \cdot a$
- $a \times b \neq b \times a$
- $a \times b = -b \times a$

ഉദാഹരണം

2x2 ന്റെ 3x3 മെട്രിക്സുകളുടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണക്കാക്കുക


$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$$\det A = |ad - bc|$$

$$\det B = a|ei - fh| + b|gh - ie| + c|gh - ge|$$

മെട്രിക്സ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതി



$$\begin{aligned} \text{Area of } \square &= |a| \times h \\ &= |a| \times |b| \sin \theta \end{aligned}$$

$$\text{Area of } \square = |a \times b|$$

$$|a \times b| = |a| |b| \sin \theta$$

$$\begin{aligned} |a \times b| &= |a| |b| \sin \theta \\ &= |a| |b| \sin \theta \\ &= |a| |b| \sin \theta \end{aligned}$$

(13) നമ്മുടെ രണ്ട് ലിനിയർ സമീകരണങ്ങൾ.

$$\begin{aligned} 1) \quad 3x + y &= 4 \\ 2x - 3y &= -1 \end{aligned}$$

ലിനിയർ സമീകരണ 2 നമ്മുടെ രണ്ട് സമീകരണങ്ങൾ.

വിധന

1) ഇരട്ടിയിൽ നമ്മുടെ സമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് (0x2B)

2) ഇരട്ടിയിൽ 0 നൽകി ലഭിക്കുന്നതാണ്.

3) ലഭിക്കാത്ത നമ്മുടെ രണ്ട് സമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്.

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$$

0x2B

$$x \cdot 0 \cdot 1 = 0 \cdot 1 \cdot 0x2B$$

$$2x = 0 \cdot 1 \cdot B$$

$$1x = 0 \cdot 1 \cdot B$$

$$x = \begin{bmatrix} \frac{3}{11} & \frac{1}{11} \\ \frac{2}{11} & \frac{3}{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$


$$x=1 \\ y=1 //$$

0x2B

$$0 \cdot 1 = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$


$$= \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

04) අනුක්‍රමයේ මධ්‍යම අගයය සොයන්න.



$$A = \int_a^b y \, dx = \int_a^b f(x) \, dx$$

$y = f(x)$ ශ්‍රිතයේ අගයයන් මත පදනම්ව අගයය සොයා ගැනීමේදී මධ්‍යම අගයය සොයන්න.



$$V = \int_a^b \pi \cdot y^2 \, dx$$

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 \, dx$$

12] ද්විපද සාරාංශය

$$(a+x)^n = \underbrace{(a+x)(a+x)\dots\dots(a+x)}_{n \text{ ගුණක}}$$

$$= a^n + {}^nC_1 a^{n-1}x + {}^nC_2 a^{n-2}x^2 + \dots + {}^nC_n a^0x^n$$

$$(a+x)^n = \sum_{r=1}^n {}^nC_r a^{n-r} x^r$$

$${}^nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

උදාහරණය වියන්න පුලුවන පොදා දමන්න,

$$(a+x)^6 = \sum_{r=0}^6 {}^6C_r a^{6-r} x^r$$

$n=6$ $r=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

$$= {}^6C_0 a^6 x^0 + {}^6C_1 a^5 x^1 + {}^6C_2 a^4 x^2 + {}^6C_3 a^3 x^3 + {}^6C_4 a^2 x^4 + {}^6C_5 a x^5 + {}^6C_6 a^0 x^6$$

* ද්විපද සාරාංශය සලකන්න.
* පිළිතුර සලකන්න.

පිළිතුර.

$${}^6C_1 = \frac{6!}{5!1!} = \frac{5! \times 6}{5! \times 1} = 6$$

$${}^6C_6 = 6$$

$${}^6C_3 = \frac{6!}{3!3!} = 20 //$$

Date _____

$${}^nC_0 = 1$$

$${}^nC_n = n$$

$$(a+x)^n = \sum_{r=0}^n {}^nC_r a^{n-r} x^r$$

↓ ഇരുപതു വലുതാക്കി

$$T_{r+1} = {}^nC_r a^{n-r} x^r$$

ഇരുപതു വലുതാക്കി $T_{0+1} = {}^nC_0 a^{n-0} x^0$

ഇരുപതു വലുതാക്കി $T_{1+1} = {}^nC_1 a^{n-1} x^1$

മറുപടി വലുതാക്കി $T_{m+1} = {}^nC_{m+1} a^{n-(m+1)} x^{m+1}$

ഉദാഹരണം.

(01) $(a+x)^n = \sum_{r=0}^n {}^nC_r a^{n-r} x^r$

(02) $r+1$ ന്റെ വലുതാക്കി T_{r+1}

(03) ${}^nC_r = \frac{n!}{(n-r)! r!}$

(04) $n! = (n-1)! \times n$

ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയുക

ഉദാ ${}^nC_r = \frac{n!}{(n-r)! r!}$

$$\left. \begin{array}{l} {}^nC_0 = 1 \\ {}^nC_n = 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} {}^nC_0 = \frac{n!}{(n-0)! 0!} \\ {}^nC_n = \frac{n!}{(n-n)! n!} \end{array}$$

$$\textcircled{2} nC_1 = \frac{n!}{(n-1)!1!} = \frac{(n-1)! \times n}{(n-1)! \times 1} = n$$

$$\textcircled{3} nC_{n-1} = n$$

$$= \frac{n!}{(n-(n-1))! (n-1)!} = \frac{n!}{1! (n-1)!}$$

$$= \frac{(n-1)! n}{(n-1)! 1!} = n$$

$$\textcircled{4} nC_r = nC_{n-r} = \frac{n!}{(n-(n-r))! (n-r)!} = \frac{n!}{r! (n-r)!}$$

അനുസരിച്ച്,

$$(1+x)^n = \sum_{r=0}^n nC_r x^r$$

$$\text{ഇതിൽ } x=1 \Rightarrow nC_r$$

$$x^n \text{ യുടെ } x=1 \Rightarrow nC_r x^{n-r}$$